

Prevempet

Shampoo

Fórmula:

Cada 100 ml contém:

Permetrina 0,10 g

Veículo q.s.p. 100,00 mL

Modo de usar:

USO EXCLUSIVAMENTE EXTERNO.

Uso exclusivamente externo, via tópica. Após molhar o corpo do animal, aplicar o Prevempet Shampoo, começando pela cabeça em direção à cauda, evitando a área dos olhos e demais mucosas, massageando em sentido contrário ao dos pelos até obter uma espuma. Aguardar o produto agir por 10 minutos. Enxaguar o animal com água, adequadamente e secá-lo em temperatura ambiente. Repetir o procedimento por 3 dias. A frequência de aplicação varia de acordo com o quadro clínico do animal e as orientações do médico veterinário. Recomenda-se tratar também o ambiente onde vivem os animais, utilizando produtos adequados.

Precauções: O produto é de uso externo, sendo proibida sua ingestão. Evitar o contato do produto com as mucosas do animal.

Em caso de ingestão acidental, não há antídoto específico, o tratamento é feito pelos sintomas clínicos de acordo com a orientação do médico veterinário.

Conservar a embalagem bem fechada, em temperatura ambiente (15-30 °C), ao abrigo da luz solar e da umidade, fora do alcance de crianças e animais domésticos.

INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO: Grupo Químico: Piretrinas. Antídoto: Não há antídoto específico, somente tratamento sintomático e de manutenção. Telefone de Emergência: Centro de Informações Toxicológicas (21) 2270-0295 (Sinitox - FioCruz).

PRECAUÇÕES, ADVERTÊNCIAS E PRIMEIROS SOCORROS: O PRODUTO É IRRITANTE PARA OS OLHOS, OCORRENDO CONTATO DO PRODUTO COM OS OLHOS E COM A PELE, LAVE-OS IMEDIATAMENTE.

CUIDADOS NO MANUSEIO DO PRODUTO: USE LUVAS DE BORRACHA.

EM CASO DE DÚVIDAS E INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO LIGAR PARA SAC: (21) 2157-5757.

Em caso de ingestão acidental do produto o tratamento será sintomático.

MANTENHA FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS, CUIDADO PERIGOSO SE INGERIDO.

Em caso de intoxicação, procurar o centro de intoxicações ou serviço de saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Não reutilizar as embalagens vazias. Manter o produto na embalagem original.

CONTRAINDICAÇÕES: Os gatos são mais sensíveis aos efeitos e consequentemente, não devem ser tratados com a permetrina; bem como cães filhotes e gestantes. Os peixes, as abelhas, os invertebrados aquáticos e os gatos são muito sensíveis à permetrina.

ADVERTÊNCIAS ENVOLVENDO HUMANOS:

Contato com os olhos: Lavar imediatamente com água corrente em abundância por 15 minutos no mínimo, levantando e abaixando a pálpebra superior ocasionalmente.

EFEITOS COLATERAIS E INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: NÃO POSSUI.

Talco

Fórmula:

Cada 100 g contém:

Permetrina 1,00 g

Ácido Bórico 2,00 g

Excipiente q.s.p. 100,00 g

Modo de usar:

USO EXCLUSIVAMENTE EXTERNO. Pulverizar o Prevempet Talco sobre todo o corpo do animal,

espalhando com uma escova, de modo que o produto entre em contato com a pele. Recomenda-se aplicar também nos locais de permanência do animal. Uma aplicação semanal é suficiente para controlar as reinfestações.

Usar luvas protetoras para a aplicação do produto.

Advertências:

Não utilizar a embalagem vazia.

Não guardar ou aplicar junto de alimentos, bebidas, medicamentos, produtos de higiene e cosméticos.

INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO:

Grupo Químico: Piretrinas.

Antídoto: Não há antídoto específico, somente tratamento sintomático e de manutenção.

Telefone de Emergência: Centro de Informações Toxicológicas (21) 2270-0295 (Sinitox - FioCruz)

PRECAUÇÕES, ADVERTÊNCIAS E PRIMEIROS SOCORROS:

EVITAR ASPIRAR O PRODUTO. EVITAR APLICAÇÕES NAS ÁREAS PRÓXIMAS AOS OLHOS E NARINAS. PRODUTO TÓXICO

PARA PEIXES, ABELHAS E PÁSSAROS. EM CASO DE INGESTÃO ACIDENTAL NÃO HÁ ANTÍDOTO ESPECÍFICO, O TRATAMENTO É FEITO PELOS SINTOMAS CLÍNICOS DE ACORDO COM A ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO.

O PRODUTO É IRRITANTE PARA OS OLHOS, OCORRENDO CONTATO DO PRODUTO COM OS OLHOS E COM A PELE,

LAVE-OS IMEDIATAMENTE.

CUIDADOS NO MANUSEIO DO PRODUTO: USE LUVAS DE BORRACHA.

EM CASO DE DÚVIDAS E INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO LIGAR PARA SAC: (21) 2157-5757.

Em caso de ingestão acidental do produto o tratamento será sintomático.

MANTENHA FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS, CUIDADO PERIGOSO SE INGERIDO.

Em caso de intoxicação, procurar o centro de intoxicações ou serviço de saúde, levando a embalagem ou

o rótulo do produto. Não reutilizar as embalagens vazias. Manter o produto na embalagem original.

CONTRAINDICAÇÕES: ESTE PRODUTO É CONTRA INDICADO EM CADELAS GESTANTES, ANIMAIS IDOSOS E DEBILITADOS.

ADVERTÊNCIAS ENVOLVENDO HUMANOS:

Contato com os olhos: Lavar imediatamente com água corrente em abundância por 15 minutos no mínimo,

levantando e abaixando a pálpebra superior ocasionalmente.

EFEITOS COLATERAIS E INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: NÃO POSSUI.

Conservar a embalagem bem fechada, em temperatura ambiente (15-30°C), ao abrigo da luz solar e da umidade, fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Sabão

Fórmula:

Cada 100 g contém:

Permetrina 0,12 g

Butóxido de piperonila 0,60 g

*Excipiente q.s.p. 100,00 g

* (Álcool 96°, Amido e Sabão Neutro)

Uso tópico.

Indicação: Indicado no controle de pulgas, carrapatos e piolhos dos cães e gatos.

Modo de usar: Molhar o corpo do animal e aplicar o Prevempet Sabão. Friccionar até obter espuma abundante. Deixar o produto atuar durante alguns minutos. Enxaguar com bastante água e repetir a aplicação. Uma aplicação semanal é suficiente para controlar as reinfestações.

Precauções: Recomenda-se o uso de luvas de borracha durante a aplicação. Não guardar ou aplicar junto de alimentos, bebidas, medicamentos, produtos de higiene e cosméticos. Em caso de ingestão acidental, não há antídoto específico. O tratamento deve ser feito pelos sintomas clínicos, de acordo com a orientação do Médico Veterinário.

Grupo Químico: Piretróides