

Provet
Sintex

Provex

Praziquantel, Pirantel, Febantel

USO VETERINÁRIO

O Provex é composto por Praziquantel, Pirantel e Febantel, ingredientes com ampla margem de segurança e excelente ação anti-helmíntica que atua contra as formas larvares e adultas de cestódeos, nematódeos que acometem os cães.

FÓRMULA	Cada comprimido de 600 mg contém: Praziquantel 0,050 g Pamoato de Pirantel 0,144 g Febantel 0,150 g Excipientes q.s.p. 0,600 g
INDICAÇÕES	Vermifugo de amplo espectro para cães, que age contra as formas adultas e larvares dos seguintes cestódeos e nematódeos: <i>Ancylostoma caninum</i> , <i>Echinococcus multilocularis</i> , <i>Joyeuxiella pasqualei</i> , <i>Mesocostoides spp.</i> , <i>Multiceps multiceps</i> , <i>Taenia hydatigena</i> , <i>Taenia pisiformis</i> , <i>Taenia ovis</i> , <i>Toxocara canis</i> , <i>Toxascaris leonina</i> , <i>Uncinaria stenocephala</i> , <i>Trichuris vulpis</i> .
MODO DE USAR E POSOLOGIA	Administrar o medicamento por via oral em dose única. O comprimido pode ser misturado a ração ou a carne, dispensando regime especial ou jejum prévio. Administrar 1 comprimido para cada 10 Kg de peso do animal fracionando-o quando necessário, realizando a pesagem do animal previamente. Para uma completa vermifugação, repetir a dose 21 dias depois. Animais adultos podem ser vermifugados de 3 a 4 vezes ao ano. Obs.: Recomenda-se o tratamento com antipulgas no ambiente e no animal para prevenir reinfestação de <i>Dipylidium caninum</i> , onde as pulgas são hospedeiros intermediários.
EFEITOS COLATERAIS	Doses excessivas de Praziquantel induzem anorexia, vômitos, salivação, diarreia e letargia em menos de 5% dos animais que recebem a droga. Não possui antídoto. Fazer tratamento sintomático.
INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS	O uso concomitante com dexametasona reduz a biodisponibilidade do praziquantel. Devido às suas propriedades colinérgicas à administração do pirantel em conjunto com outras drogas colinérgicas como o levamisol, pode levar a potencialização da sua toxicidade. Não usar medicamento a base de piperazina devido a ação antagonista ao pamoato de pirantel.
CONTRAINDICAÇÕES	O pirantel não é recomendado para animais gravemente debilitados, presumivelmente porque sua ação farmacológica (propriedades semelhantes a nicotina) é mais pronunciada nesses hospedeiros.
APRESENTAÇÃO	Caixa com 1 strip de 4 comprimidos de 600 mg. Display com 25 strips de 4 comprimidos de 600 mg cada.

Conservar a embalagem bem fechada, em temperatura ambiente (15-30°C), ao abrigo da luz solar e da umidade, fora do alcance de crianças e animais domésticos.