

06/11/2020



| Tranquilizante e sedativo para cães e gatos. | |
|---|--|
| FÓRMULA | Cada 100 mL contém: Acepromazina (maleato) 1,00 g Veículo q.s.p. 100,00 mL |
| INDICAÇÕES | O uso da acepromazina é indicado como tranquilizante e sedativo em cães e gatos: - Facilita a contenção dos animais para procedimentos clínicos, diagnósticos e cirúrgicos; tratamento de feridas e abscessos, sondagem uretral, devido ao estado de quietude promovido pela baixa da atividade motora espontânea; - Auxilia no manejo durante embarque e transporte de animais; - Produz efeitos antieméticos, prevenindo a êmese e regurgitação; - Os fenotiazínicos também são usados como pré-anestésicos: aumentam os efeitos dos anestésicos gerais através da depressão do sistema nervoso central (SNC). |
| CONTRAINDICAÇÕES E PRECAUÇÕES | - A acepromazina deve ser utilizada com cautela e em pequenas doses em animais com disfunção hepática, doença cardíaca, idosos ou debilitados; - Em adição, por conta de seus efeitos hipotensivos, a acepromazina é contraindicada em pacientes com hipovolemia e choque circulatório, devido ao bloqueio de receptores α -adrenérgicos; - Também é contraindicada em animais prenhes; - A acepromazina não deve ser usada para controle de convulsão e nem em animais epilépticos por diminuir o limiar convulsivo. |
| MODO DE USAR E POSOLOGIA | Administrar por via oral, diretamente na boca do animal. - Cães e gatos: administrar 0,6 até 3,0 mg/Kg, ou seja, de 2 a 9 gotas, por quilo de peso corporal. Dose única; - Os efeitos da tranquilização em cães iniciam-se após 5 minutos de administração, apresentando eficácia sedativa por 35 minutos. Em gatos, os efeitos iniciam-se após 10 minutos de administração do medicamento, chegando a até 50 minutos de eficácia sedativa; - Cada gota contém 0,32 mg de acepromazina; - As doses podem variar de acordo com a prescrição do médico veterinário. |
| EFEITOS COLATERAIS E REAÇÕES ADVERSAS | - Em altas doses, pode causar efeitos extrapiramidais caracterizados por rigidez, tremore e catalepsia; - Pode causar hipotensão arterial, resultante do bloqueio de receptores α -adrenérgicos periféricos e consequente vasodilatação. |
| LIMITAÇÕES DE USO | - Os cães braquicefálicos e cães de raças gigantes são mais sensíveis aos efeitos da acepromazina. Portanto, orienta-se a redução da dose de acepromazina em 50% nessas raças; - A acepromazina possui efeito analgésico insignificante. Não deve ser administrada sem terapia analgésica eficaz em procedimentos dolorosos, pois seus efeitos não permitem a avaliação da dor. - Administrar em animais adultos. Não utilizar em animais prenhes ou em lactação. |
| INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS | - A acepromazina é potencializadora da toxicidade dos organosfosforados. Portanto, não deve ser usada para tratar os tremores decorrentes do uso dessas substâncias; - A administração de adrenalina é contraindicada em animais medicados com fenotiazínicos (acepromazina), pois acarreta maior depressão da pressão arterial; - Como os fenotiazínicos bloqueiam os efeitos periféricos das catecolaminas, diminuem a incidência de arritmias associadas a catecolaminas, vistas nas anestésias com barbitúricos de ultracurta duração e com anestésicos inalatórios; - A acepromazina é contraindicada para o uso em procedimentos de anestesia epidural, devido à potencialização da atividade hipotensora dos anestésicos locais. |
| APRESENTAÇÃO | Frasco plástico conta-gotas contendo 20 mL, 30 mL e 40 mL. |
| VENDA SOB PRESCRIÇÃO E ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO COM RETENÇÃO OBRIGATORIA DA NOTIFICAÇÃO DE RECEITA. ATENÇÃO: USO PROIBIDO EM ANIMAIS PRENHES. MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. | |

**CONSERVAR O MEDICAMENTO PROTEGIDO DA LUZ, ARMAZENADO EM
EMBALAGEM FECHADA, EM LOCAL SECO E FRESCO.**

Licenciado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob o nº RJ000817-6.000001.
Responsável Técnico: Lilion Manhães Pessanha
CRF - RJ 3229
Proprietário e Fabricante:
ProvetS Simões Laboratório Ltda.
Rua Pereira de Almeida, 90 / 90A
Praça da Bandeira - Rio de Janeiro - RJ
CNPJ 04.239.400/0001-05
Indústria Brasileira.
☎ SAC: (21) 2157-5757
www.provetSIMOES.com.br